



Recomendaciones SEOM de vacunación para pacientes con cáncer



VACUNA	TIPO	N.º DE DOSIS	INTERVALO DOSIS ¹	OBSERVACIONES
TRIPLE VÍRICA (sarampión, rubéola y parotiditis)	Vacuna atenuada/ viva.	2 dosis.	4 semanas *En caso de haber recibido una dosis con anterioridad se administrará solo una dosis.	Se recomienda serología pretratamiento si no se conoce si se ha vacunado previamente. -Si serología negativa: administrar una dosis al menos 4 semanas antes de comenzar tratamiento. -Se recomienda repetir serología a los 12 meses tras finalizar tratamiento y administrar una dosis de vacuna si es negativa.
VARICELA	Vacuna atenuada/ viva.	2 dosis.	4 semanas. *Preferiblemente 8 semanas.	Se recomienda serología pretratamiento. -Si serología negativa: administrar una dosis al menos 4 semanas antes de comenzar tratamiento.
NEUMOCOCO	Vacuna inactivada.	2 dosis: VCN13 + VNP23 *Revacunar a los 5 años con VNP23 si persiste la situación de inmunosupresión.	8 semanas.	
HEPATITIS	Vacuna inactivada.	3 dosis.	0, 1 y 6 meses.	Se recomienda serología pretratamiento (AgHBs, anti-HBc y anti-HBs), independientemente del estado vacunal. -Si todos son negativos: - Pauta completa si no vacunación previa. - Dosis de recuerdo si vacunación previa.
DIFTERIA-TÉTANOS-FERINA (dTpa)	Vacuna inactivada.	1 dosis.		
HERPES ZÓSTER	Vacuna inactivada.	2 dosis.	2 meses. *ventana de 1-6 meses para la segunda dosis.	Pacientes con QT la primera dosis entre 8 -30 días de comenzar la QT, segunda dosis ventana ente 1 y 6 meses. Si el tratamiento ya está iniciado se puede administrar la vacuna antes del inicio de un ciclo de quimioterapia.
GRIPE	Vacuna inactivada.	1 dosis.	Estacional.	
SARS-COV-2	Vacuna inactivada.	2 dosis *dosis de refuerzo estacional.	4 semanas.	

1. Hace referencia al intervalo mínimo entre dosis

Recomendaciones para el momento óptimo de vacunación

ANTES DEL INICIO DE QUIMIOTERAPIA

Vacunas inactivadas:
Al menos 2 semanas antes.

Vacunas atenuadas:
Al menos 4 semanas antes.

DESPUÉS DE COMPLETAR LA QUIMIOTERAPIA

Vacunas inactivadas:
De 3 a 6 meses (aconsejable 6 meses).

Vacunas atenuadas:
De 6 a 12 meses (aconsejable 12 meses).

